CARDIOCINE ®160 mg
Acide Acétylsalicylique
Comprimé sécable

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car Elle contient des informations importantes pour vous.
· Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
· Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
· Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
· Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

1. QU'EST-CE QUE CARDIOCINE 160 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
Dénomination
CARDIOCINE 160 mg, Boite de 30.
Composition/forme pharmaceutique
La substance active est :
Acide acétylsalicylique.....160 mg
Pour un comprimé sécable
Les autres composants sont : Cellulose microcristalline, amidon de maïs prégélatinisé, croscarmellose sodique et l'acide stéarique.
Classe pharmacothérapeutique
ANTI-THROMBOTIQUES/INHIBITEURS DE L'AGREGATION PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE
CARDIOCINE agit sur les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang. CARDIOCINE est utilisé par les patients qui présentent un rétrécissement important des vaisseaux sanguin du cœur (angor instable) ou qui ont subi une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (AVC). CARDIOCINE permet de réduire le risque de récidive d'un nouvel infarctus, en empêchant la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins du cœur et du cerveau. Votre médecin peut décider d'associer ce médicament avec d'autres traitements s'il le juge nécessaire.
Ce médicament est réservé à l'adulte. Vous ne devez pas débuter un traitement par CARDIOCINE 160 mg, comprimé sécable sans l'accord de votre médecin.

2.QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDIOCINE 160 mg, comprimé sécable ?
N'utilisez jamais CARDIOCINE 160 mg, comprimé sécable dans les cas suivants :
•si vous êtes allergique à la substance active (l'acide acétylsalicylique) ou à l'un des autres composants contenus dans CARDIOCINE 160 mg, comprimé sécable, mentionnés dans la rubrique 1,
•si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille que l'aspirine (les anti-inflammatoires non stéroïdiens = AINS),
•si vous avez ou avez déjà eu des symptômes allergiques (comme des difficultés respiratoires, congestion nasale, écoulement nasal, éruption cutanée) pendant que vous prenez l'acide acétylsalicylique ou des médicaments anti-inflammatoires similaires,
•si vous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou du duodénum,
•si vous souffrez d'hémophilie,
•si vous avez déjà eu une hémorragie ou une perforation au niveau de l'estomac après avoir pris de l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens),
•si vous présentez un déficit en plaquettes qui permettent au sang de coaguler,
•si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur,

3. PRECAUTIONS D'EMPLOI-MISES EN GARDE SPECIALES
Faites attention avec CARDIOCINE 160 mg, comprimé sécable :
Vous devez prévenir votre médecin **avant de prendre** CARDIOCINE 160 mg, comprimé sécable si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
•si vous êtes traité(e) avec un médicament qui empêche la formation de caillots sanguins ou un diurétique,
•si vous avez une maladie gastro-intestinale
•si vous souffrez d'insuffisance cardiaque
•si vous souffrez d'une maladie des reins ou du foie.
•si vous avez des règles abondantes,
•Les personnes souffrant d'asthme bronchique, de maladie pulmonaire chronique, de rhume des foins ou de polypes nasaux présentent un risque accru de réactions d'hypersensibilité
Si une intervention chirurgicale est prévue :
L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même lorsque la dernière prise de ce médicament date de plusieurs jours.
Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de la prise de ce médicament, dans le cas où une opération, même mineure, est envisagée.

4. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDIOCINE 160 mg, comprimé sécable ?
Prise ou utilisation d'autres médicaments
Prévenez votre médecin avant de prendre CARDIOCINE 160 mg, comprimé sécable si vous prenez :
•méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 20 mg /semaine (médicament utiliser pour traiter certains cancers),
•topiques gastro-intestinaux, antiacides et adsorbants (médicament utilisés pour traiter les douleurs digestives ou les ulcères digestifs),
•anticoagulant oral, thrombolytiques ou héparines (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),
•un autre médicament à base de ticlopidine ou clopidogrel (médicaments utilisés pour fluidifier le sang), sauf dans certaines situations où votre médecin pourra vous prescrire conjointement de l'aspirine et du clopidogrel,
•un autre médicament à base de benzbromarone ou probénécide (médicaments utilisés pour traiter la goutte),
•un autre médicament à base d'anagrélide (médicament utilisé pour diminuer le nombre de plaquettes dans le sang),
•anti-inflammatoires non stéroïdiens (médicament utilisé dans le traitement de la douleur et de la fièvre),
•ticagrelor (dans les indications validées),
•cobimétinib,
•ibrutinib,
•un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou les troubles anxieux).
•médicaments mixtes adrénergiques-sérotoninergiques,
•un autre médicament à base de défibrotide (médicament utilisé pour le traitement d'une maladie dans laquelle les vaisseaux sanguins du foie sont endommagés et obstrués par des caillots sanguins),
•nicorandil (médicament utilisé pour traiter l'angine de poitrine).
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
CARDIOCINE 160 mg, comprimé sécable avec des aliments, boissons et de l'alcool
La consommation d'alcool doit être évitée pendant le traitement en raison d'un risque augmenté de lésions au niveau gastro-intestinal.
Grossesse
Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique). Ne prendre AUCUN AUTRE médicament contenant de l'aspirine (y compris les médicaments sans ordonnance).
•jusqu'à 100 mg par jour : Pendant toute la grossesse, si nécessaire, votre médecin spécialiste peut être amené à vous prescrire de l'aspirine à faibles doses (inférieures ou égales à 100 mg par jour), dans des circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance spécialisée. Si tel est le cas, il est très important de respecter scrupuleusement l'ordonnance de votre médecin, sans dépasser les doses prescrites.
•entre 100 et 500 mg par jour : Par mesure de précaution, les recommandations ci-dessous s'appliquent, sauf prescription contraire de votre médecin spécialiste.
•à partir de 500 mg par jour :
•Avant le début du 6ème mois de grossesse (jusqu'à la 24ème semaine d'aménorrhée), vous ne devez pas prendre ce médicament, sauf en cas d'absolue nécessité déterminée par votre médecin, en raison du risque potentiel de fausses couches ou de malformations. Dans ce cas, la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.

A partir du début du 6ème mois jusqu'à la fin de la grossesse
(au-delà de la 24ème semaine d'aménorrhée), ce médicament est contre-indiqué, vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves voire fatales, notamment sur le cœur, les poumons et/ou les reins, et cela même avec une seule prise.
Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte, parlez-en immédiatement à votre gynécologue obstétricien, afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée si nécessaire.

Allaitement

L'aspirine passant dans le lait maternel, ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.
DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

Fertilité

L'aspirine, comme tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), peut altérer la fertilité des femmes et entraîner des difficultés pour devenir enceinte, de façon réversible à l'arrêt du traitement. Informez votre médecin si vous planifiez une grossesse ou si vous avez des difficultés à concevoir.

Conduite de véhicules et utilisation des machines

CARDIOCINE n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Liste des excipients à effet notoire : Aucun

5. COMMENT PRENDRE CARDIOCINE 160 mg, comprimé sécable ?

Posologie et mode d'administration

Ce médicament est réservé à l'adulte.
Ce médicament est à prendre par voie orale.
La dose habituelle est de 1 comprimé par jour, à avaler entiers avec un verre d'eau.
Votre médecin vous indiquera combien de comprimé vous devez prendre chaque jour.
Respectez toujours la dose indiquée par votre médecin.
En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien

Durée de traitement

La durée du traitement est déterminée par votre médecin. N'utilisez pas CARDIOCINE 160 mg, comprimé sécable de façon prolongée sans l'accord de votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de CARDIOCINE 160 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

Prévenez rapidement votre médecin, en particulier s'il s'agit d'un enfant.
Un surdosage peut être mortel, en particulier chez l'enfant. Les principaux symptômes d'intoxication sont : des bourdonnements d'oreille, une sensation de baisse de l'audition, des maux de tête, des vertiges, voire dans les cas plus graves de la fièvre, une hypoglycémie importante (baisse du taux de sucres dans le sang), une chute rapide de la tension artérielle, une respiration accélérée et une perte de la conscience (coma).
Si ces signes surviennent, vous devez arrêter immédiatement le traitement et vous rendre en urgence dans un hôpital pour que vous y soyez traité.
Un œdème du poumon non lié à une insuffisance cardiaque peut survenir en cas de surdosage aigu et chronique avec l'aspirine (voir 6. Quels sont les effets indésirables ?). Cet œdème peut être mortel en cas de surdosage.

Si vous oubliez de prendre CARDIOCINE160 mg, comprimé sécable :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
Continuez votre traitement normalement et prévenez votre médecin.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

6. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir :

Effets indésirables rares (affectent moins d'un patient sur 1 000) :
Saignement dans le tractus gastro-intestinal, peut se manifester par des selles noires
Hémorragie cérébrale, les symptômes peuvent être un engourdissement ou une paralysie du visage, des bras et des jambes, généralement dans une moitié du corps, des difficultés d'élocution, de la confusion, des troubles visuels, des étourdissements, des problèmes d'équilibre, des maux de tête sévères
Éruption cutanée sévère telle que :
Éruptions cutanées rougeâtres qui apparaissent souvent d'abord sur le haut du corps, les éruptions cutanées apparaissent comme des tâches rondes ou en forme de cibles, souvent avec des cloques au milieu, une desquamation de la peau, des plaies dans la bouche, la gorge, le nez, les yeux et autour des organes génitaux. Ces éruptions cutanées graves peuvent être précédées de fièvre et de symptômes pseudo-grippaux (syndrome de Steven Johnson, nécrolyse épidermique toxique)
Éruption cutanée généralisée, fièvre et hypertrophie des ganglions lymphatiques qui surviennent environ 2 à 6 semaines (parfois jusqu'à 8 semaines) après le début du traitement (réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (syndrome DRESS))
Autres effets secondaires
Effets indésirables fréquents (affectent plus d'1 patient sur 100) : des douleurs d'estomac, risque accru de saignement.
Effets indésirables peu fréquents (affectent plus d'1 patient sur 1000): Réactions d'hypersensibilité telles que rhume des foins, rhinite allergique et asthme.
Effets indésirables rares (affectent moins d'un patient sur 10 000): Hémorragie digestive, hémorragie cérébrale, impact sur les reins, réactions cutanées graves
Les personnes souffrant d'allergies ou d'asthme connues présentent un risque accru de réactions d'hypersensibilité. Une perte mineure de sang peut entraîner dans certains cas une anémie.
Des étourdissements et des acouphènes peuvent être des symptômes de surdosage.
Dans tous ces cas, consultez rapidement un médecin.

7.COMMENT CONSERVER CARDIOCINE 160 mg, comprimé sécable ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
A conserver dans son emballage extérieur d'origine à l'abri de l'humidité.
AMM N° : 9363123

ان هذا الدواء

– الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
– الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
– اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
– لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
– لا تعد ولا تزد عليها دون استشارة الطبيب.

لا تترك الدواء في متناول ايدي الاطفال

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit. Mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- suivez les conseils de votre pharmacien
- votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament ses contre-indications.
-N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas. N'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

NE LAISSEZ JAMAIS LES MEDICAMENTS A PORTEE DE MAIN DES ENFANTS

ACT Pharma

Titulaire / Exploitant Fabricant
ACT Pharma
Z.I 9013 OUED ZARGA - BEJA - TUNISIE